

HOSPITALITYLAWYER^Σ® C.O.

Términos y condiciones para los Formularios, las Listas de Verificación, y los Procedimientos

Los formularios, las listas de verificación, y los procedimientos en HospitalityLawyer.com se proporcionan con propósitos informativos, educativos, e ilustrativos solamente. HospitalityLawyer.com no rinde asesoramiento jurídico. Se debe consultar siempre a profesionales legales para necesidades, preguntas, y servicios específicos. Si se elige utilizar un formulario, una lista de verificación, o un procedimiento, se hace a su propio riesgo. HospitalityLawyer.com no hace ninguna representación que los formularios, las listas de verificación, o los procedimientos sean convenientes para su uso particular y el usuario debe asegurarse siempre independientemente de la exactitud y de la conformidad legal para su jurisdicción particular.

QUÉ HACER SI SOSPECHA DE UNA SOBREDOSIS DE FENTANILO



- No tocar nada en la habitación.
- Salir de la habitación y llamar al 911 (o número de emergencias) inmediatamente.
- Si en el hotel se dispone de naxolona, un fármaco que puede neutralizar temporalmente los efectos de una sobredosis de opiáceos, administrárselo siguiendo las instrucciones.
- Administrar a la persona otra dosis de naxolona si los signos y síntomas no desaparecen o si reaparecen.

SI CREE QUE HA ESTADO EN CONTACTO CON LA DROGA, DESCONTAMINAR PERSONALMENTE Y SEGUIR ESTOS PASOS:

- El contacto directo de la piel con el fentanilo sospechoso debe lavarse inmediatamente con grandes cantidades de agua.
- Tan pronto como sea posible, las superficies de la piel deben lavarse además con agua y jabón.
- NO utilizar desinfectantes de manos a base de alcohol ni soluciones blanqueadoras con hipoclorito, ya que pueden potenciar la absorción cutánea de fentanilo.

LIMPIEZA Y DECONTAMINACIÓN

- Evitar la contaminación mientras se retira el EPI.
- Aislar los EPI utilizados para su descontaminación o eliminación.
- Descontaminar las superficies de los EPI con toallitas absorbentes y una solución a base de ácido peracético (5%) o peróxido de hidrógeno (10%).
- Minimizar el uso de soluciones descontaminantes a base de cloro libre, ya que pueden deteriorar el EPI.

QUÉ HACER SI SOSPECHA DE UNA SOBREDOSIS DE FENTANILO



LIMPIEZA/RECUPERACIÓN DE LA HABITACIÓN TRAS UNA SOBREDOSIS DE FENTANILO

- Seguir las políticas y procedimientos del Departamento de Salud local.
- Recurrir a una empresa de saneamiento profesional.
- Puede ser costoso, así que consultar con su compañía de seguros la posible cobertura.
- A menudo, como en el caso de las plagas de insectos de la cama, es necesario retirar o sustituir: cortinas, alfombras, colchones, maletas

SOBREDOSIS CON RESULTADO DE MUERTE

- Seguir las directrices y procedimientos del Departamento de Salud local para la remediación.
- Tener en cuenta el posible trauma sufrido por otros huéspedes y empleados.